

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ

Η υπογνάθιος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μέγεθος αδένας ο οποίος παράγει σάλιο και ο πρώτος σε παραγόμενη ποσότητα. Βρίσκεται στον τράχηλο προς την μέση γραμμή λίγο κάτω και πίσω από το πηγούνι. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν λίθοι ή αναπτυχθεί όγκος ή κύστη στην περιοχή τότε γίνεται αφαίρεση όλου του αδένα και του εκφορητικού του πόρου, μαζί με το πρόβλημα. Συνήθως τα συμπτώματα είναι η διόγκωση στην περιοχή του αδένα μετά από γεύμα και ίσως πόνος και ευαισθησία της περιοχής. Προεγχειρητικά μπορεί να γίνουν: υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία και παρακέντηση για λήψη υλικού για βιοψία.

Η Επέμβαση

Αφαίρεση του υπογναθίου αδένα μαζί με τους λίθους ή τον όγκο που περιλαμβάνει και αποστολή για ιστολογική εξέταση. Εάν υπάρχει προσβολή λεμφαδένων τραχήλου μπορεί να γίνει και αφαίρεση ομάδων τραχηλικών λεμφαδένων

*Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900*